



Grupo de Estudo  
e Pesquisa da Sede

## INCIDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS NA PROPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEDE PERIOPERATÓRIA

**Autores:** Luisa Arietti Andriotti; Maria Eduarda Sodr  Franco; Hosana Cristina Ferreira Ramos; Leonel Alves do Nascimento;  
**Ligia Fahl Fonseca**

**Institui o:** Universidade Estadual de Londrina

### Introdu o

A sede   um sintoma comum em pacientes cir rgicos, devido diversos fatores, tais como: tempo de jejum; intuba o; perda de volume sang neo; ansiedade; medicamentos que reduzem a produ o de saliva, entre outros. A sede pode resultar em um intenso desconforto e sofrimento para o paciente, influenciando de forma negativa na experi ncia cir rgica deste. No entanto, a sede ainda n o   contemplada em nenhuma taxonomia diagn stica de enfermagem.

### Objetivo

Avaliar a incid ncia das caracter sticas definidoras relacionadas a proposi o do Diagn stico de Enfermagem Sede Perioperat ria comparando-as no pr  e p s-operat rio imediato.





## INCIDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS NA PROPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEDE PERIOPERATÓRIA

### Método

Pesquisa quantitativa, analítica e transversal, realizada no pré e pós-operatório imediato em um hospital universitário de grande porte no período de dois meses, seguindo um roteiro estruturado. A amostra foi não probabilística, por conveniência, com 150 pacientes de ambos os sexos, com idade superior a 12 anos. Os dados foram duplamente digitados e analisados com o auxílio do programa SPSS v23 e apresentados em frequências percentuais e medidas de tendência central. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 94634018.5.0000.5231).


### Resultados

Participaram 150 pacientes com média de idade de 43,1 ( $\pm 18,5$ ) anos, predominância do sexo feminino (59,3%), cor branca (56%) e clínica cirúrgica ginecológica (26%). A média de tempo de jejum foi de 13 horas ( $\pm 5:11$ ) variando de duas a 41 horas. A sede teve prevalência de 69,3% e 81,3% e intensidade média de 4,62 ( $\pm 3,6$ ) e 5,67 ( $\pm 3,53$ ) no pré e pós-operatório respectivamente.





## INCIDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS NA PROPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEDE PERIOPERATÓRIA



### Resultados

As incidências das características definidoras no pré e pós-operatório foram: boca seca (75,3%-86,7%); lábios ressecados (71,3%-82,7%); vontade de beber água (64%-72,7%); constante deglutição de saliva (62,7%-70%); garganta seca (58%-72%); saliva grossa (48,7%-53,4); língua grossa (46%-54,7%); gosto ruim na boca (41%-46%); relato do cuidador (0,7%-0%).





## INCIDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS NA PROPOSIÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEDE PERIOPERATÓRIA

### Conclusão

A sede possui alta prevalência em toda a experiência cirúrgica aumentando no pós-operatório, assim como suas características definidoras que foram identificadas em alta proporção já no pré-operatório e apresentaram um aumento, em sua maioria significativos do pré para o pós-operatório, demonstrando a possível influência do procedimento anestésico-cirúrgico, aumento do tempo de jejum, entre outros fatores.

A proposição do Diagnóstico de Enfermagem de Sede Perioperatório pode auxiliar os profissionais no planejamento e implementação de ações para este desconforto, melhorando assim a experiência cirúrgica do paciente.

### Referências

1. Serato VM, Fonseca FL, Birolim MM, Rossetto EG, Mai LD, Garcia AKA. Package of menthol measures for thirst relief: a randomized clinical study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 2019;72(3):600-8. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0057>
2. Martins PR, Fonseca LF. Avaliação das dimensões da sede: revisão integrativa. **Revista Eletrônica de Enfermagem**. 2017; 19:a09. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v19.40288>.
3. Oliveira LD DE L.; Nascimento SF DO; Farias CRL DE. Avaliação das dimensões da sede no paciente cirúrgico ortopédico. **Revista SOBECC**, 2020; 25(2), 99-104. Disponível em: <https://doi.org/10.5327/z1414-4425202000020006>